

Chetogena acuminata

Rondani, 1859




Mosca

NATIVA

DIPTERA
Tachinidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Europa, África y Asia.

En Canarias se encuentra principalmente en medianías y zonas costeras, siendo más frecuente en estas últimas.



IDENTIFICACIÓN

4 - 7 mm.

El borde posterior del escutelo rojizo, junto con el abdomen negro con tres bandas de pulverulencia blanquecina y terminado en punta, en las hembras, son las características más destacadas. El cuerpo está cubierto de cerdas largas y erectas, sobre todo en el abdomen. La cara es blanca, con una banda longitudinal rojiza en la mitad de la frente. Ambos sexos son bastante similares, siendo los machos más pequeños, con la frente algo más estrecha y el abdomen ligeramente truncado en el extremo.



PLANTAS VISITADAS

Es habitual en las inflorescencias de diversas especies de *Euphorbia*. También tiene cierta apetencia por Asteraceae, como *Argyranthemum*, *Launaea* o *Schizogyne*, y por Apiaceae, como *Astydamia* o *Foeniculum*.



CICLO VITAL

Las larvas son parásitas de larvas de escarabajos de la familia Tenebrionidae.



Chetogena acuminata (hembra), en *Polycarphaea nivea*.
Foto: Gustavo Peña.



Chetogena acuminata (macho), en *Argyranthemum frutescens*.
Foto: Gustavo Peña.