

Cyphocleonus armitagei Wollaston, 1864




ENDÉMICA

COLEOPTERA
Curculionidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



Endémica de Canarias.

Puede encontrarse en medianías y zonas altas de la vertiente norte de la isla, siendo más frecuente en áreas de cumbre.



IDENTIFICACIÓN

13 - 18 mm.

Destaca la cara prolongada hacia delante a modo de trompa, con las antenas situadas en su extremo. El cuerpo es oval, alargado, de color negro, recubierto de forma variable de una pulverulencia marrón-rojiza. Presenta tres bandas blancas longitudinales en el tórax, una central fina y dos laterales más anchas, y bandas blancas oblicuas en los élitros, a veces reducidas a series de pequeñas manchas.



PLANTAS VISITADAS

Se observa casi exclusivamente sobre *Argyranthemum*, aunque ocasionalmente puede verse en otras plantas, como *Pteroccephalus* o *Cheirolophus*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan en el interior de las raíces de las mismas plantas cuyas flores visitan los adultos, sobre todo en *Argyranthemum*.



Cyphocleonus armitagei, en *Cheirolophus teydis*. Foto: Gustavo Peña.



Cyphocleonus armitagei, en *Argyranthemum broussonetii*.
Foto: Domingo Sosa.