

Aricia cramera

Eschscholtz, 1821




Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA
Lycaenidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Norte de África y sur de Europa.

En Canarias puede encontrarse desde las partes bajas hasta las cumbres, y sobre todo en la vertiente norte de las islas. Es especialmente frecuente en los claros de las zonas de pinar.



IDENTIFICACIÓN

23 - 30 mm. (envergadura alar).

Muestra un fuerte contraste entre la coloración de la cara dorsal y ventral de las alas. Ambos pares de alas son por arriba de color marrón oscuro, con una serie de lúnulas naranjas cerca del borde lateral, algo mayores en las hembras. En el centro de las alas anteriores hay además un pequeño punto negro. La cara ventral tiene una coloración de fondo marrón pálido, con las mismas lúnulas naranjas que la cara dorsal, pero además con numerosas manchas negras orladas de blanco.



PLANTAS VISITADAS

Tiene cierta predilección por *Origanum*, *Micromeria*, *Daphne* o *Pterocephalus*. También visita asiduamente *Asteraceae*, como *Argyranthemum*, *Carlina*, *Centaurea* o *Sonchus*, y *Brassicaceae*, como *Descurainia* o *Hirschfeldia*.



CICLO VITAL

Las larvas se alimentan de ciertas plantas herbáceas, sobre todo *Tuberaria*, *Helianthemum*, *Geranium* o *Erodium*. Las orugas son atendidas por hormigas de la especie *Lasius grandis*.



Ariacia cramera (hembra). Foto: Gustavo Peña.



Ariacia cramera (macho), en *Sideritis dasygnaphala*.

Foto: Francisco Molina.