

Plagiolepis schmitzi

Forel, 1895




NATIVA

HYMENOPTERA
Formicidae



DISTRIBUCIÓN



Norte de África y sur de Europa.

En Canarias es frecuente sobre todo en medianías y zonas altas, siendo más escasa en la franja costera árida.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima



IDENTIFICACIÓN

2 mm.

Es una de las hormigas más pequeñas, por lo que suele pasar desapercibida. La coloración general del cuerpo es marrón oscuro, más o menos brillante, con patas y antenas más claras. Las filas de pelos largos y erectos en el borde los segmentos del gáster son características.



PLANTAS VISITADAS

Acuden asiduamente a Euphorbia, aunque también suelen visitar *Carlina*, *Echium*, *Periploca* o *Aeonium*.



CICLO VITAL

Forman sus colonias en el interior de arbustos muertos o tocones de árboles. Es una especie cazadora, aunque es frecuente verlas recolectando néctar de flores, así como melaza de pulgones. Es una especie muy dominante y territorial.



Plagiolepis schmitzii (obrero), en *Euphorbia balsamifera*.

Foto: Gustavo Peña.



Plagiolepis schmitzii (obrero), en *Periploca laevigata*.

Foto: Gustavo Peña.