Taylorilygus apicalis Fieber, 1861

Chinche

NATIVA

HETEROPTERA
Miridae

DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

Cosmopolita.
En Canarias se encuentra ampliamente distribuida por las zonas bajas.

IDENTIFICACIÓN

4 - 5 mm.

El cuerpo es oval y alargado, con coloración predominantemente verde-amarillenta, aunque hay ejemplares con una tonalidad más parda. Los hemiélitros presentan algunas manchas alargadas marrones y están cubiertos por una fina pubescencia blanquecina; el ápice membranoso se encuentra característicamente doblado hacia abajo. Las antenas son muy largas, divididas en cuatro segmentos y de color rojizo en casi toda su longitud. Los ojos son grandes y blanquecinos.

PLANTAS VISITADAS

Se observa casi exclusivamente sobre Asteraceae, como *Argyranthemum*, *Asteriscus* o *Glebionis*.

CICLO VITAL

Las ninfas se desarrollan sobre una gran variedad de plantas, sobre todo de la familia Asteraceae, alimentándose de savia y néctar, así como de huevos y pequeñas larvas de lepidópteros.

Taylorilygus apicalis, en *Argyranthemum frutescens*. Foto: Gustavo Peña.

Taylorilygus apicalis, en *Argyranthemum frutescens*. Foto: Gustavo Peña.