# Amegilla quadrifasciata de Villers, 1789



NATIVA

## HYMENOPTERA Apidae



### **DISTRIBUCIÓN**


### **FENOLOGÍA**



Ausencia

Abundancia media

Abundancia máxima



En Canarias, se distribuye principalmente por las zonas bajas, siendo relativamente común.



#### **IDENTIFICACIÓN**

**12 - 15 mm.** El cuerpo es robusto, con la cabeza y el tórax recubiertos de una densa pilosidad, que por arriba puede variar de un color vivo naranja o rojizo a un gris amarillento, más bien blanquecina en las partes inferiores. El abdomen es negro, con anchas bandas blancas en el borde posteriorde los terguitos, que en el último segmento se reducen a dos mechones blancos a los lados. Los ojos son de color gris claro y la cara es blanca con dos manchas rectangulares negras en el centro, en las hembras, o completamente blanca, en los machos. La cara externa de las tibias está recubierta de abundantes pelos blancos, incluyendo las escopas en las patas traseras de las hembras.



#### **PLANTAS VISITADAS**

Se han registrado visitas a más de sesenta géneros de plantas de diversas familias. Entre las más frecuentadas se encuentran *Lavandula, Echium, Campylanthus, Limonium* o *Bituminaria*. También acude habitualmente a Asteraceae, como *Kleinia, Launaea* o *Carlina*, y a Brassicaceae, como *Cakile, Raphanus* o *Brassica*. Además, es bastante atraída por algunas plantas ornamentales, como *Lantana, Bougainvillea* o *Pelargonium*.



#### **CICLO VITAL**

Las hembras excavan sus nidos en lugares con suelos poco compactados y desprovistos de vegetación. Los nidos consisten en un túnel principal vertical que conduce a un número variable de celdas de cría. En cada celda se desarrolla una única larva a expensas de la mezcla de polen y néctar recolectada por la hembra. Los nidos son parasitados por abejas de la especie *Thyreus histrionicus*.



Amegilla quadrifasciata (hembra), en Carlina salicifolia. Foto: Gustavo Peña.



Amegilla quadrifasciata (macho), en Kleinia neriifolia.

Foto: Mónica Pérez.