

# *Anastoechus latifrons* Macquart, 1839




Mosca

ENDÉMICA

DIPTERA  
Bombyliidae



## DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Aunque presenta una distribución amplia, es más frecuente en medianías y zonas altas.

## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia media

Abundancia máxima



## IDENTIFICACIÓN

7 - 12 mm.

De cuerpo robusto y muy peludo, imita el aspecto de una abeja. La pilosidad de la mitad dorsal del cuerpo es marrón-rojiza, en contraste con la de la mitad inferior, que es blanca. Posee, además, una distintiva banda de pelos negros en la frente. También es llamativa la trompa, larga y recta, que apunta hacia delante en reposo. El borde anterior de las alas tiene un tinte rojizo y las patas son rosáceas. Los machos son más pequeños y tienen la frente más estrecha.



## PLANTAS VISITADAS

Suele observarse posada en el suelo, haciendo visitas ocasionales a las flores. Tiene cierta preferencia por Asteraceae, como *Launaea*, *Schizogyne*, *Asteriscus* o *Carlina*. También suele visitar Lamiaceae, como *Lavandula* y *Micromeria*, así como *Echium*, *Erysimum* o *Pterocephalus*.



## CICLO VITAL

Las larvas se alimentan de los estuches de huevos de diversas especies de saltamontes de la familia Acrididae.



*Anastoechus latifrons* (hembra), en *Pterocephalus dumetorus*.

Foto: Gustavo Peña.



*Anastoechus latifrons* (macho). Foto: Gustavo Peña.