

Andrena mediovittata

Pérez, 1895




NATIVA

HYMENOPTERA
Andrenidae



DISTRIBUCIÓN



Norte de África.

En Canarias, su distribución se limita a las zonas bajas de la vertiente meridional, más áridas, siendo una especie más bien escasa.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima



IDENTIFICACIÓN

10 - 11 mm.

La principal característica que permite diferenciar esta especie de otras del género son las bandas translúcidas marrones que muestra en el tegumento del borde posterior de todos los terguitos, siendo el resto del abdomen de color negro brillante. La cabeza y el cuerpo se encuentran recubiertos de pilosidad marrón-rojiza. Las alas se muestran parcialmente oscurecidas. Los machos son muy similares a las hembras, aunque de tamaño menor y con las antenas algo más largas.



PLANTAS VISITADAS

Sus visitas se concentran en Asteraceae, como *Launaea*, *Schizogyne* o *Asteriscus*, aunque también acude a plantas de otras familias, como *Euphorbia*, *Heliotropium*, *Hirschfeldia* o *Aizoon*.



CICLO VITAL

Todas las especies del género *Andrena* nidifican en el suelo. El nido consiste en una galería principal vertical que se ramifica en su parte terminal, con una celda de cría al final de cada ramal. En cada celda se desarrolla una sola larva a expensas de la mezcla de polen y néctar depositada por la hembra. Son característicos los túmulos de tierra que se forman alrededor de la entrada de los nidos.



Andrena mediovittata (hembra), en *Schizogyne sericea*.
Foto: Francisco Molina.



Andrena mediovittata (macho), en *Euphorbia lamarckii*.
Foto: Gustavo Peña.