Andrena vachali Pérez, 1895

Abeja

NATIVA

HYMENOPTERA
Andrenidae

DISTRIBUCIÓN

FENOLOGÍA

Norte de África.
En Canarias, se encuentra fundamentalmente en zonas montañosas y valles del interior, evitando la franja costera.

IDENTIFICACIÓN

Presenta un claro dimorfismo sexual. En las hembras es muy llamativa la pilosidad de color rojo herrumbre que recubre el tórax y las escopas en las tibias traseras, en fuerte contraste con el resto del cuerpo, de color negro. Los escasos pelos que recubren la cabeza y el abdomen son también oscuros. Las alas se presentan algo ahumadas. Los machos, en cambio, presentan el cuerpo cubierto de una larga pilosidad blanca o grisácea y tienen las antenas más largas y el abdomen más estrechado.

PLANTAS VISITADAS

Manifiesta bastante preferencia por Asteraceae, como *Glebionis, Asteriscus, Reichardia, Sonchus* o *Launaea*. También visita asiduamente las flores de *Hirschfeldia* y, más ocasionalmente, *Lotus, Ferula* o *Euphorbia*.

CICLO VITAL

Todas las especies del género *Andrena* nidifican en el suelo. El nido consiste en una galería principal vertical que se ramifica en su parte terminal, con una celda de cría al final de cada ramal. En cada celda se desarrolla una sola larva a expensas de la mezcla de polen y néctar depositada por la hembra. Son característicos los túmulos de tierra que se forman alrededor de la entrada de los nidos.

Andrena vachali (hembra), en *Glebionis coronaria*.
Foto: Kurt Geeraerts.

Andrena vachali (macho), en *Glebionis coronaria*.
Foto: Mónica Pérez.