

Anthophora lieftincki

Tkalců, 1993




ENDÉMICA

HYMENOPTERA
Apidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia
Abundancia media
Abundancia máxima

Endémica de Canarias.

Se distribuye ampliamente desde la franja costera hasta las áreas más elevadas del interior.



IDENTIFICACIÓN

9 - 10 mm.

Lo más distintivo de esta especie son los ojos de color verde pálido. El cuerpo es rechoncho y compacto, recubierto de abundante pilosidad blanco grisácea, más marrón en la zona dorsal. El abdomen es negro con bandas de pelos blancos en el borde posterior de los terguitos, y en el caso de las hembras, recubierto además de pulverulencia grisácea. Las escopas, en las patas traseras de las hembras, son blanco grisáceas. La cara es completamente blanca en los machos.



PLANTAS VISITADAS

Se encuentra bastante especializada en Asteraceae, como *Pulicaria*, *Launaea*, *Asteriscus* o *Glebionis*. También acude con frecuencia a *Heliotropium*. Más ocasionalmente puede encontrarse en otras plantas, como *Mesembryanthemum* o *Cakile*.



CICLO VITAL

Excava sus nidos en áreas llanas, despejadas de vegetación y con suelo compactado. Cada hembra construye un nido, que consiste en un túnel subterráneo principal, que da acceso a varias celdas de cría. En cada una de ellas deposita un huevo junto a una mezcla de polen y néctar, que servirá de alimento para las larvas.



Anthophora lieftincki (hembra), en *Pulicaria canariensis*.

Foto: Kurt Geeraerts.



Anthophora lieftincki (macho), en *Pulicaria canariensis*.

Foto: Bernard Jacobi.