

Anthrenus verbasci

Linnaeus, 1767




NATIVA

COLEOPTERA
Dermestidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA



Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Cosmopolita.

En Canarias se encuentra sobre todo en zonas bajas y de medianías.



IDENTIFICACIÓN

2-3 mm.

EstaSe caracteriza por tener el cuerpo muy redondeado y completamente revestido de pequeñas escamas de color blanco, negro y dorado, que forman un patrón variegado. La cabeza es muy pequeña y las antenas están terminadas en maza de tres artejos.



PLANTAS VISITADAS

Se encuentra generalmente en Apiaceae, como *Daucus* o *Astydamia*, y en Asteraceae, como *Argyranthemum* o *Galactites*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan a expensas de materiales que contienen quitina y queratina. Esto incluye plumas de aves, pelos de mamíferos, insectos muertos, prendas de lana, etc. Por esta razón suelen encontrarse en nidos de aves, mamíferos o de insectos, como abejas. Ocasionalmente pueden dañar alimentos almacenados e incluso afectar a las colecciones de los museos.



Anthrenus verbasci, en *Argyranthemum frutescens*. Foto: Gustavo Peña.



Anthrenus verbasci, en *Argyranthemum frutescens*. Foto: Gustavo Peña.