Attagenus abbreviatus Heer, 1857

Escarabajo

ENDÉMICA

COLEOPTERA
Dermestidae

DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

Endémica de Canarias.
Se distribuye por áreas costeras, siendo más común en las islas orientales.

IDENTIFICACIÓN

3-4 mm.

Destaca la densa y larga pilosidad blanquecina que recubre su cuerpo ovalado. La coloración de fondo es marrón oscura, con unas apenas aparentes bandas transversales irregulares de tonalidad rosácea en los élitros. Los machos se distinguen por las mazas antenales muy largas. Se conocen seis especies del género *Attagenus* en Canarias, todas muy similares entre sí, por lo que pueden ser confundidas.

PLANTAS VISITADAS

Es habitual en Asteraceae, como *Launaea, Glebionis* o *Calendula,* aunque también puede encontrarse en plantas de otras familias, como *Euphorbia, Tetraena, Polycarpaea* o *Mesembryanthemum.*

CICLO VITAL

Las larvas de las especies de la familia Dermestidae se alimentan de productos que contienen queratina (lanas, pieles, plumas, seda, insectos muertos) y pueden ser encontradas en diferentes sustratos, como nidos de aves abandonados o cadáveres secos de animales.

Attagenus abbreviatus (hembra), en *Euphorbia balsamifera*.
Foto: Gustavo Peña.

Attagenus abbreviatus (macho), en *Calendula arvensis*.
Foto: Gustavo Peña.