

Bombylius oceanus

Becker, 1908




Mosca

ENDÉMICA

DIPTERA
Bombyliidae



DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Vive casi exclusivamente en zonas costeras arenosas.

FENOLOGÍA



IDENTIFICACIÓN

5 - 6 mm.

De cuerpo robusto y muy peludo, imita el aspecto de una abeja. La pilosidad es larga, de color marrón-grisácea en el tórax y en la base del abdomen, blanquecina en el resto del cuerpo. El tórax se encuentra muy desarrollado, en contraste con la cabeza, que es proporcionalmente pequeña y situada en una posición baja. La probóscide es muy larga y recta. Las patas son grisáceas. Los machos se distinguen por tener los ojos unidos en la frente y las alas algo oscurecidas en su mitad anterior.



PLANTAS VISITADAS

Manifiesta cierta preferencia por las flores de *Heliotropium*, aunque visita otras plantas como *Cakile*, *Tetraena*, *Polycarphaea*, *Launaea* o *Euphorbia*.



CICLO VITAL

Las larvas del género *Bombylius* se desarrollan como parásitas en el interior de los nidos de ciertas abejas solitarias, especialmente del género *Andrena*.



Bombylius oceanus (hembra), en *Euphorbia lamarckii*.

Foto: Gustavo Peña.



Bombylius oceanus (macho), en *Polycarphaea nivea*.

Foto: Gustavo Peña.