

Calliphora vicina

Robineau-Desvoidy, 1830




Mosca

INTRODUCIDA

DIPTERA
Calliphoridae



DISTRIBUCIÓN



Cosmopolita.

Introducida en Canarias. Es una especie ampliamente distribuida por todo tipo de ambientes, de costa a cumbre.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia media

Abundancia máxima



IDENTIFICACIÓN

8 -12 mm.

Aunque de tamaño muy variable, siempre presenta un aspecto robusto, destacando el abdomen voluminoso, de color azul metálico. Las mejillas tienen una tonalidad anaranjada. Ambos sexos tienen un aspecto similar, diferenciándose principalmente porque las hembras tienen la frente bastante más ancha.



PLANTAS VISITADAS

Aunque los adultos suelen alimentarse de jugos en excrementos frescos o en frutas maduras, también suelen visitar flores para sorber néctar, en especial del género *Euphorbia*, así como *Periploca* o *Aeonium*. En menor medida, también son atraídas por Asteraceae, como *Argyranthemum* o *Pericallis*, y Apiaceae, como *Astydamia* o *Athamanta*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan en cadáveres de animales, alimentándose de los tejidos en descomposición. También pueden alimentarse en heridas abiertas de animales vivos, incluyendo al ser humano.



Calliphora vicina (hembra).
Foto: Gustavo Peña.



Calliphora vicina (macho), en *Euphorbia canariensis*.
Foto: Gustavo Peña.