

Camponotus feae

Emery, 1882




ENDÉMICA

HYMENOPTERA
Formicidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia Abundancia media Abundancia máxima

Endémica de Canarias.

Es abundante y ampliamente distribuida, desde las áreas costeras hasta las cumbres.



IDENTIFICACIÓN

16 - 10 mm. Las obreras son polimórficas, es decir, existe variación en la forma y el tamaño, pudiendo encontrar obreras de pequeño tamaño y constitución grácil, con la cabeza estrecha y pequeña y obreras grandes con proporciones más robustas y con la cabeza grande, ancha y con el borde posterior cóncavo. La coloración del cuerpo también es variable, con dos formas cromáticas negra y roja, y el tegumento está cubierto por una pilosidad que le da un aspecto mate, sin brillo. El gáster o abdomen presenta pelos largos y erectos, dispersos.



PLANTAS VISITADAS

Puede visitar una gran variedad de plantas para recolectar néctar. Se encuentra en gran número sobre *Euphorbia*, aunque también tiene predilección por Apiaceae, como *Astydamia*, *Ferula* o *Foeniculum*. Suele frecuentar también plantas de otras familias, como *Aeonium*, *Periploca*, *Rubia* o *Cneorum*.



CICLO VITAL

Forman colonias en nidos profundos contruidos bajo tierra. Las obreras recolectan néctar floral y melaza producida por pulgones, aunque también capturan pequeños invertebrados.



Camponotus feae (obrero), en *Euphorbia balsamifera*.

Foto: Gustavo Peña.



Camponotus feae (obrero), en *Polycarpaea nivea*.

Foto: Gustavo Peña.