

# *Chrysomya albiceps*

Wiedemann, 1819




Mosca

INTRODUCIDA

DIPTERA  
Calliphoridae



## DISTRIBUCIÓN



## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



África, sur de Europa y sur de Asia. Introducida en Sudamérica.

Introducida en Canarias. Puede encontrarse en todo tipo de ambientes, de costa a cumbre, aunque es más frecuente en las zonas bajas.



## IDENTIFICACIÓN

6 -10 mm.

Destaca por la coloración verde metálica del tórax y abdomen, aunque hay ejemplares que muestran reflejos cobrizos o azulados. La cara es blanca y posee bandas negras transversales en el tórax y en el abdomen. Ambos sexos son muy similares, diferenciándose por la frente más ancha en las hembras.



## PLANTAS VISITADAS

Es un visitante habitual de *Euphorbia* y *Periploca*. También acude con frecuencia a Apiaceae, como *Astydamia* o *Foeniculum*, y a Asteraceae, como *Schizogyne*, *Argyranthemum* o *Sonchus*. Otras plantas que suele visitar son *Cneorum*, *Aeonium* o *Echium*.



## CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan en cadáveres de animales, donde se comportan como depredadoras de larvas de otros insectos carroñeros.



*Chrysomya albiceps* (hembra), en *Astydamia latifolia*.  
Foto: Gustavo Peña.



*Chrysomya albiceps* (macho), en *Paronychia canariensis*.  
Foto: Gustavo Peña.