

# Coccinella miranda

Wollaston, 1864




ENDÉMICA

COLEOPTERA  
Coccinellidae



## DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Se encuentra fundamentalmente en zonas de medianías y cumbres, siendo especialmente frecuente en pinares.

## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



## IDENTIFICACIÓN

4 - 5 mm.

Se caracteriza por la forma semiesférica, aunque ligeramente alargada, del cuerpo, que es además muy brillante. La cabeza y el tórax son negros, con dos pequeñas manchas blancas en la cara; los bordes laterales y anterior del tórax están también manchados de blanco. Los élitros son naranjas, normalmente con una franja negra a lo largo de la sutura de unión y dos largas manchas arqueadas negras en cada uno de ellos. Ocasionalmente, este patrón de coloración puede variar, con las manchas negras fusionadas en mayor o menor medida.



## PLANTAS VISITADAS

Aunque los adultos son depredadores de pulgones, ocasionalmente visitan ciertas flores, sobre todo de Asteraceae, como *Argyranthemum*, *Asteriscus* o *Galactites*, y de Apiaceae, como *Athamanta*.




## CICLO VITAL

Las larvas viven sobre diferentes plantas, donde depredan pulgones y otros diminutos artrópodos.



*Coccinella miranda*, en *Athamanta montana*. Foto: Francisco Molina.



*Coccinella miranda*, en *Ruta pinnata*. Foto: Gustavo Peña.