

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758




NATIVA

COLEOPTERA
Coccinellidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia Abundancia media Abundancia máxima

Norte de África, Europa y Asia. Introducida en Norteamérica.

En Canarias se encuentra la ssp. *algerica*, que se distribuye por el norte de África. Puede ser encontrada desde las zonas costeras hasta las cumbres



IDENTIFICACIÓN

6 - 8 mm.

Se caracteriza, como la mayoría de miembros de la familia Coccinellidae, por la forma semiesférica del cuerpo, que es además muy brillante. La cabeza y el tórax son negros, con dos pequeñas manchas blancas en la frente y dos amplias manchas blancas en los ángulos anteriores del tórax. Los élitros son rojos a anaranjados, normalmente con cuatro manchas redondas negras en cada uno de ellos. Ocasionalmente este patrón de coloración puede variar, con las manchas negras fusionadas en mayor o menor medida.



PLANTAS VISITADAS

Aunque los adultos son depredadores de pulgones, ocasionalmente visitan flores, sobre todo de Asteraceae, como *Glebionis*, *Galactites*, *Calendula* o *Argyranthemum*, y de Apiaceae, como *Foeniculum*, *Athamanta* o *Astydamia*. También suelen encontrarse sobre *Euphorbia*.



CICLO VITAL

Las larvas viven sobre diferentes plantas, donde depredan pulgones y otros diminutos artrópodos.



Coccinella septempunctata, en *Daphne gnidium*. Foto: Gustavo Peña.



Coccinella septempunctata, en *Athamanta montana*.
Foto: Francisco Molina.