

Colias croceus

Geoffroy, 1785




Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA
Pieridae



DISTRIBUCIÓN



Norte de África, Europa y oeste de Asia. Migratoria.

En Canarias se distribuye por todo tipo de ambientes, desde las áreas costeras hasta las cotas más elevadas.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima



IDENTIFICACIÓN

52 - 62 mm. (envergadura alar).

Dorsalmente, las alas son de color amarillo-anaranjado, más intenso en las alas anteriores. El margen exterior de ambos pares de alas presenta una ancha banda oscura, que en el caso de las hembras contiene una serie de manchas amarillas. Normalmente la cara dorsal solo puede verse mientras vuela, estando las alas siempre cerradas en reposo o cuando se alimenta. La cara ventral es similar en ambos sexos, y presenta una tonalidad amarillo-verdosa, aunque en las alas anteriores muestra además una amplia zona anaranjada y una serie de puntos irregulares negros; en las posteriores destaca una mancha central blanca con anillo rojizo. Es habitual encontrar hembras de la forma helice, más pálidas, con las alas anteriores parcialmente blancas.



PLANTAS VISITADAS

Se puede observar visitando una amplia variedad de plantas. Entre sus preferencias se encuentran *Asteraceae*, como *Galactites*, *Launaea*, *Sonchus*, *Dittrichia* o *Bidens*; *Brassicaceae*, como *Erysimum* o *Hirschfeldia*; y *Fabaceae*, como *Bituminaria* o *Lotus*. También visita asiduamente plantas de otras familias, como *Pterocephalus*, *Heliotropium* o *Mesembryanthemum*.



CICLO VITAL

Las larvas se alimentan de diversas especies de plantas de la familia *Fabaceae*, como *Trifolium*, *Lotus* o *Chamaecytisus*.



Colias croceus (hembra), en *Pterocephalus lasiospermus*.

Foto: Gustavo Peña..



Colias croceus (macho), en *Erysimum albescens*.

Foto: Pablo Martínez-Darve.