

# Colletes moricei

Saunders, 1904




ENDÉMICA

HYMENOPTERA  
Colletidae



## DISTRIBUCIÓN



### Endémica de Canarias.

Su distribución se limita casi exclusivamente a las zonas costeras del sur, siendo solo frecuente en la isla de Tenerife; en el resto de islas es bastante más rara.

## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



*Colletes moricei* (hembra), en *Schizogyne sericea*.  
Foto: Gustavo Peña.



## IDENTIFICACIÓN

7 - 9 mm.

Destaca el abdomen, ancho en su base y bastante aguzado hacia el extremo, de color negro con bandas blancas bien marcadas en el borde de todos los terguitos. La cabeza y el tórax se encuentran recubiertos de abundante pilosidad marrón pálido, más blanca en la cara y en las partes inferiores. Los machos se diferencian por su tamaño algo menor, antenas más largas y pilosidad del cuerpo más larga y blanquecina.



## PLANTAS VISITADAS

Es bastante especialista en sus preferencias florales. La mayor parte de sus visitas se concentran en las flores de *Plocama*, *Reseda* y de *Asteraceae*, como *Schizogyne*, *Launaea* o *Sonchus*. También acude con cierta frecuencia a las inflorescencias de *Euphorbia*.



## CICLO VITAL

Nidifica de forma gregaria en taludes de tierra compactada, pudiendo llegar a concentrarse centenares de nidos en un corto espacio. Cada nido consiste en una galería subterránea que termina en varias celdas, donde se desarrollan las larvas a expensas de las reservas de polen y néctar acopiadas por la hembra. Los nidos son cleptoparasitados por la abeja *Epeolus flavociliatus*.



*Colletes moricei* (macho), en *Euphorbia lamarckii*.  
Foto: Gustavo Peña.