

Crematogaster alluaudi

Emery, 1893




ENDÉMICA

HYMENOPTERA
Formicidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia
Abundancia media
Abundancia máxima

Endémica de Canarias.

Aunque se distribuye ampliamente desde las zonas costeras hasta las cumbres, es especialmente frecuente en áreas forestales de medianías.



IDENTIFICACIÓN

4 mm.

El género es fácilmente distinguible por la forma acorazonada del gaster en vista dorsal y la especie se distingue del resto por no presentar espinas en el tórax. Toda la superficie del cuerpo es muy brillante, con escasa pilosidad. La cabeza y el tórax son de color rojo, en marcado contraste con el gáster, que es negro. En la zona norte de Tenerife habita una variedad que se diferencia por presentar todo el cuerpo negro salvo la cabeza que sigue siendo de color rojo.



PLANTAS VISITADAS

Acuden asiduamente a Euphorbia, aunque también suelen visitar *Carlina*, *Echium*, *Periploca* o Aeonium.



CICLO VITAL

Forman sus colonias en el interior de arbustos muertos o tocones de árboles. Es una especie cazadora, aunque es frecuente verlas recolectando néctar de flores, así como melaza de pulgones. Es una especie muy dominante y territorial.



Crematogaster alluaudi (obrero), en *Euphorbia lamarckii*.

Foto: Gustavo Peña.



Crematogaster alluaudi (obrero), en *Carlina salicifolia*.

Foto: Gustavo Peña.