

# *Dischistus atlanticus*

Santos-Abreu, 1926




Mosca

ENDÉMICA

DIPTERA  
Bombyliidae



## DISTRIBUCIÓN



## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia  
media

Abundancia  
máxima

### Endémica de Canarias.

Tiene preferencia por valles y zonas montañosas del interior, aunque también puede observarse en la franja costera.



## IDENTIFICACIÓN

12 - 14 mm.

El cuerpo es muy robusto y peludo, imitando a una abeja. La pilosidad es marrón en la parte dorsal y blanca en los laterales, en las partes inferiores y en el borde de los terguitos. La trompa es tan larga como la cabeza y el tórax juntos, recta y apuntando hacia delante en reposo. Las alas son inusualmente estrechas. Las patas son negras, salvo las tibias rojas. Los machos se diferencian por tener los ojos muy próximos en la frente.



## PLANTAS VISITADAS

Puede visitar gran variedad de plantas, entre las que se incluyen *Launaea*, *Limonium*, *Lycium*, *Helianthemum*, *Heliotropium*, *Echium*, *Cakile*, *Matthiola*, *Erodium* o *Euphorbia*.



## CICLO VITAL

Se desconoce el modo de vida de las larvas.



*Dischistus atlanticus* (hembra), en *Erodium* sp.  
Foto: Gustavo Peña.



*Dischistus atlanticus* (macho), en *Euphorbia regis-jubae*.  
Foto: Gustavo Peña.