

Euchloe charlonia

Donzel, 1842




Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA
Pieridae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA



Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Norte de África.

En las islas orientales es más frecuente en áreas del interior, sobre todo en terrenos de cultivo. En Gran Canaria es un inmigrante reciente, muy localizado en escasos puntos del litoral oriental.



IDENTIFICACIÓN

28 - 30 mm. (envergadura alar).

La coloración de fondo de las alas es amarilla, salvo el ápice de las alas anteriores y sendas manchas cuadrangulares junto al borde anterior, negros. Ventralmente, el dibujo de las alas anteriores es similar, aunque el ápice es verdoso; las alas posteriores son verdosas en su totalidad, con algunas pequeñas manchas blancas. Los machos son muy similares a las hembras, aunque más pequeños.



PLANTAS VISITADAS

Visita las flores de plantas de muy bajo porte, estando entre sus preferencias *Heliotropium* o *Mesembryanthemum*. También suele acudir a *Brassicaceae*, como *Erucastrum*, *Hirschfeldia* o *Carrichtera*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan fundamentalmente en plantas de la familia *Brassicaceae*, como *Carrichtera*, *Hirschfeldia* o *Sisymbrium*, aunque también pueden alimentarse de plantas de otras familias, como *Reseda* o *Kickxia*. Es una especie muy adaptada a ambientes desérticos, altamente dependiente de las precipitaciones.



Euchloe charlonia (hembra). Foto: Pablo Martínez-Darve.



Euchloe charlonia (hembra). Foto: Pablo Martínez-Darve.