

Euchloe eversi

Stamm, 1963




ENDÉMICA

LEPIDOPTERA
Pieridae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Endémica de Canarias.

Se distribuye casi exclusivamente por las zonas altas de la isla.



IDENTIFICACIÓN

30 - 43 mm. (envergadura alar).

Las alas son blancas en su cara dorsal, salvo el ápice de las alas anteriores, que es negro con una serie de manchas blancas unidas entre sí, más una mancha cuadrangular negra junto al borde anterior; éste es de un característico color amarillo. Ventralmente muestra un diseño de bandas irregulares de color verdoso-amarillento. Los machos son muy similares a las hembras, aunque un poco más pequeños. Forma parte de un complejo de tres especies, muy similares entre sí y de distribución monoisular.



PLANTAS VISITADAS

Tiene una clara preferencia por *Brassicaceae*, como *Descurainia*, *Hirschfeldia* o *Erysimum*, aunque también visita plantas de otras familias, como *Echium*, *Pterocephalus*, *Nepeta* o *Tolpis*.



CICLO VITAL

Las larvas se alimentan exclusivamente de los frutos de plantas de la familia *Brassicaceae*, como *Hirschfeldia*, o *Descurainia*. La crisálida entra en diapausa hasta la temporada siguiente.



Euchloe eversi, en *Descurainia bourgaeana*.

Foto: Pablo Martínez-Darve.



Euchloe eversi, en *Erysimum scoparium*. Foto: Domingo Sosa.