

Eumerus latitarsis

Macquart, 1839




Mosca

ENDÉMICA

DIPTERA
Syrphidae



DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Es una especie propia de las zonas bajas, aunque por la vertiente sur puede encontrarse en cotas más elevadas.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



IDENTIFICACIÓN

7 - 10 mm. El cuerpo es compacto y de coloración oscura, sin marcas destacadas. Los ojos están poblados de pequeños pelos blancos. El tórax tiene cierto brillo verdoso y presenta cuatro bandas longitudinales de tono más oscuro, poco perceptibles. El abdomen es ancho y aplanado, de color negro con reflejos azulados y con tres pares de marcas blancas oblicuas, poco destacadas. En los machos los ojos se unen en la frente por un estrecho punto. Se conocen otras nueve especies del género *Eumerus* en Canarias, de aspecto muy similar entre sí.



PLANTAS VISITADAS

La mayor parte de sus visitas florales se concentran en *Euphorbia*, aunque también suele acudir a Apiaceae, como *Astydamia* o *Foeniculum*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan en el interior de plantas de *Euphorbia* en descomposición, donde se alimentan de fluidos orgánicos.



Eumerus latitarsis (hembra), en *Euphorbia lamarckii*.
Foto: Gustavo Peña.



Eumerus latitarsis (macho), en *Euphorbia canariensis*.
Foto: Gustavo Peña.