

Eupeodes corollae

Fabricius, 1794




Mosca

NATIVA

DIPTERA
Syrphidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA



Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

África, Europa y Asia. Migratoria.

En Canarias se encuentra principalmente en zonas bajas y de medianías, a menudo en terrenos de cultivo.



IDENTIFICACIÓN

7 - 11 mm. Imita el aspecto de una avispa. El abdomen es ancho y ovalado, negro, con tres pares de manchas amarillas laterales, que se extienden hasta el borde lateral de los terguitos. En las hembras las manchas son ligeramente oblicuas y siempre están separadas, mientras que en los machos son más horizontales y gruesas, con las del segundo y tercer par normalmente conectadas por un estrecho puente. Además, los machos muestran en el extremo del abdomen una cápsula genital inusualmente grande. Las patas son anaranjadas con los fémures parcialmente negros, más en los machos que en las hembras.



PLANTAS VISITADAS

Puede visitar un amplio rango de plantas, teniendo predilección por Asteraceae, como *Sonchus*, *Argyranthemum*, *Glebionis* o *Calendula*; Brassicaceae, como *Hirschfeldia* o *Brassica*; y Apiaceae, como *Foeniculum*.



CICLO VITAL

Las larvas se alimentan de pulgones en plantas de bajo porte, sobre todo de la familia Fabaceae, así como en diferentes plantas cultivadas, por lo que se considera una especie útil en los agroecosistemas.



Eupeodes corollae (hembra), en *Brassica oleracea*.
Foto: Gustavo Peña.



Eupeodes corollae (macho), en *Reichardia tingitana*.
Foto: Gustavo Peña.