

# *Exhyalanthrax simonae*

Francois, 1970




Mosca

ENDÉMICA

DIPTERA  
Bombyliidae



## DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Presenta una distribución amplia, de costa a cumbre, aunque suele ser una especie poco abundante.

## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia  
media

Abundancia  
máxima



## IDENTIFICACIÓN

8 - 11 mm.

Se caracteriza por presentar el tercio anterior de las alas muy oscurecido, con el margen escalonado. En el tórax destacan dos bandas longitudinales de pelos blancos a ambos lados. El abdomen es corto, ancho y aplanado, de color negro con bandas de pelos marrones y dos conspicuas bandas de pelos blancos, la posterior interrumpida en su mitad. Los machos son muy similares, diferenciándose por tener la frente un poco más estrecha y el abdomen más reducido.



## PLANTAS VISITADAS

Tiene una clara preferencia por Asteraceae, como *Argyranthemum*, *Launaea*, *Schizogyne* o *Glebionis*. También visita plantas de otras familias, como *Euphorbia*, *Aeonium*, *Micromeria*, *Pterocephalus*, *Heliotropium* o *Echium*.




## CICLO VITAL

En las especies del género *Exhyalanthrax* las larvas se desarrollan a expensas de las puestas de huevos de saltamontes.



*Exhyalanthrax simonae* (hembra), en *Athamanta montana*.  
Foto: Gustavo Peña.



*Exhyalanthrax simonae* (macho), en *Argyranthemum frutescens*.  
Foto: Gustavo Peña.