

Irwinia frontata

Becker, 1908




Mosca

ENDÉMICA
MACARONESIA

DIPTERA
Therevidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Endémica de Canarias y Salvajes.

Prefiere las zonas costeras, aunque no es una especie frecuente. Más ocasionalmente, puede ser observada en áreas de medianías y cumbres.



IDENTIFICACIÓN

9 - 11 mm.

Se caracteriza por el abdomen muy alargado y de forma cónica, y por la abundante pilosidad blanquecina que recubre el cuerpo, bastante más larga en los machos, quienes, además, tienen los ojos unidos en la frente. La coloración del cuerpo es gris, con varias franjas marrón oscuro bien definidas sobre el tórax y bandeo del mismo color en el abdomen. Las alas presentan algunas manchas oscuras.



PLANTAS VISITADAS

Es un visitante esporádico de las flores, observándose la mayoría de veces en *Euphorbia*. Su dieta también incluye otro tipo de fluidos, como la melaza segregada por pulgones.



CICLO VITAL

Las larvas de las moscas de la familia *Therevidae* viven en suelos secos y son activas depredadoras de larvas de otros insectos.



Irwinia frontata (hembra), en *Euphorbia lamarckii*.

Foto: Gustavo Peña.



Irwinia frontata (macho), en *Euphorbia lamarckii*.

Foto: Gustavo Peña.