

Ischiodon aegyptius

Wiedemann, 1830




Mosca

NATIVA

DIPTERA
Syrphidae



DISTRIBUCIÓN



África, sur de Europa y oeste de Asia.

En Canarias se localiza principalmente en zonas costeras, donde no suele ser una especie abundante.

FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima



IDENTIFICACIÓN

9 - 10 mm. Su aspecto imita al de una avispa. El tórax es negro brillante, con dos anchas bandas amarillentas con forma de cuña a los lados y con el escudete también amarillo. Las patas son amarillas, aunque los fémures posteriores muestran un anillo oscuro en su extremo. El abdomen es negro, con bandas transversales amarillentas; la primera normalmente se encuentra dividida por la mitad, las dos siguientes son más anchas y las últimas muy estrechas. Los segmentos finales muestran un tinte rojizo, más evidente en los machos, los cuales además tienen los ojos más juntos en la frente.



PLANTAS VISITADAS

Acude a plantas de una gran diversidad de familias, como *Foeniculum*, *Heliotropium*, *Polycarphaea*, *Reseda*, *Drimia*, *Hirschfeldia*, *Kleinia* o *Sonchus*.



CICLO VITAL

Las larvas viven sobre la vegetación, tanto en plantas nativas como en ciertos cultivos, donde se alimentan de pulgones.



Ischiodon aegyptius (hembra), en *Foeniculum vulgare*.
Foto: Gustavo Peña.



Ischiodon aegyptius (macho), en *Drimia maritima*.
Foto: Gustavo Peña.