

Lamprolonchaea smaragdi

Walker, 1849




Mosca

INTRODUCIDA

DIPTERA
Lonchaeidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

África y sur de Europa. Introducida en Australia y Norteamérica.

Probablemente introducida en Canarias. Suele encontrarse, sobre todo, en las zonas bajas.



IDENTIFICACIÓN

3 mm.

Se caracteriza por el fuerte brillo metálico verde y dorado de su cuerpo. Las patas son negras, excepto el primer segmento del tarso, que es rojizo. Las alas son amarillentas y proporcionalmente largas, sobrepasando ampliamente el extremo del abdomen. Los machos se diferencian por tener la frente más estrecha y el último segmento abdominal más elongado.



PLANTAS VISITADAS

Es habitual en *Euphorbia*, así como en Apiaceae, como *Foeniculum* o *Astydamia*. También se ha observado sobre *Argyranthemum*, *Ruta* o *Laurus*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan en frutas y otros productos vegetales en descomposición, como papas, higos, aguacates, etc.



Lamprolonchaea smaragdi (hembra), en *Argyranthemum frutescens*.
Foto: Gustavo Peña.



Lamprolonchaea smaragdi (macho), en *Euphorbia balsamifera*.
Foto: Gustavo Peña.