

Meliscaeva auricollis

Meigen, 1822




Mosca

NATIVA

DIPTERA
Syrphidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Norte de África y Europa. Migratoria.

En Canarias se distribuye principalmente por las zonas bajas y de medianías de la vertiente norte de las islas; más rara y localizada en la vertiente sur de las islas.



IDENTIFICACIÓN

10 - 11 mm.

Imita el aspecto de una avispa. El cuerpo es delgado y de coloración general marrón oscura muy brillante; en el abdomen muestra sendos pares de manchas triangulares amarillas o anaranjadas a los lados de los terguitos. Hay cierta variabilidad, con ejemplares que poseen las máculas muy pequeñas, mientras que en otros tienen mayor desarrollo, pudiendo unirse en el centro y formar una banda continua. Las alas son bastante largas y normalmente se disponen bastante abiertas.



PLANTAS VISITADAS

Entre las plantas que visita con más frecuencia, se encuentran *Cistus*, *Hypericum*, *Rubus*, *Ranunculus*, *Euphorbia* o *Aeonium*. También acude asiduamente a Asteraceae, como *Sonchus* o *Pericallis*.



CICLO VITAL

Las larvas viven en todo tipo de vegetación, tanto árboles como arbustos y hierbas, donde depredan sobre pulgones y larvas de otros insectos.



Meliscaeva auricollis (hembra), en *Cistus monspeliensis*.
Foto: Gustavo Peña.



Meliscaeva auricollis (macho), en *Reichardia tingitana*.
Foto: Gustavo Peña.