

Mordellistena teneriffensis

Ermisch, 1965




ENDÉMICA

COLEOPTERA
Cerambycidae



DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Se encuentra principalmente en las zonas bajas y de medianías.

FENOLOGÍA



IDENTIFICACIÓN

4 - 6 mm.

Se caracteriza por la peculiar forma de su cuerpo, muy convexo dorsalmente y aplastado lateralmente, sobresaliendo un largo apéndice puntiagudo del extremo del abdomen. La coloración de fondo es negra, estando recubierto todo el cuerpo de una corta pilosidad plateada, que en los élitros se vuelve más dorada. Las patas posteriores están más desarrolladas y adaptadas al salto, estrategia que adoptan rápidamente cuando se sienten amenazados. Hay un total de seis especies del género *Mordellistena* en Canarias, todas muy similares entre sí, por lo que pueden ser confundidas.



PLANTAS VISITADAS

Manifiesta una clara preferencia por Asteraceae, como *Argyranthemum*, *Galactites* o *Glebionis*, y por Apiaceae, como *Foeniculum*.



CICLO VITAL

Las larvas de *Mordellistena* se desarrollan en el interior de los tallos y las raíces de diversas plantas. Cuando alcanzan cierto grado de desarrollo, entran en hibernación, para emerger como adultos en el siguiente año.



Mordellistena teneriffensis, en *Argyranthemum frutescens*.

Foto: Gustavo Peña.



Mordellistena teneriffensis, en *Argyranthemum frutescens*.

Foto: Gustavo Peña.