

# Musca domestica

Linnaeus, 1758




Mosca

INTRODUCIDA

DIPTERA  
Muscidae



## DISTRIBUCIÓN



## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia Abundancia media Abundancia máxima

### Introducida en Canarias.

Aunque puede encontrarse en todo tipo de ambientes, de costa a cumbre, es una especie fuertemente vinculada al ser humano, por lo que es más frecuente en lugares antropizados.



## IDENTIFICACIÓN

**5 - 8 mm.** Puede reconocerse por el contraste entre el tórax, gris con cuatro estrechas franjas longitudinales oscuras, y el abdomen, predominantemente naranja con una banda negra central, que se extiende hacia los lados en el borde apical de los terguitos. Hay, sin embargo, variaciones en el diseño del abdomen y en algunos ejemplares es muy grisáceo, sobre todo en hembras. Éstas se distinguen fácilmente de los machos por su frente más ancha.



## PLANTAS VISITADAS

Dado que se alimentan de todo tipo de fluidos, sus visitas a las flores son ocasionales. Son muy atraídas por *Periploca*, *Euphorbia* o *Cneorum*, aunque también suelen visitar *Argyranthemum*, *Foeniculum* o *Aeonium*.



## CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan en gran variedad de sustratos en descomposición, sobre todo en estiércol fresco.



*Musca domestica* (hembra), en *Argyranthemum frutescens*.  
Foto: Gustavo Peña.



*Musca domestica* (macho), en *Periploca laevigata*.  
Foto: Gustavo Peña.