

# Muscina stabulans

Fallén, 1816




INTRODUCIDA

DIPTERA  
Muscidae



## DISTRIBUCIÓN



### Cosmopolita.

Introducida en Canarias. Puede encontrarse en todo tipo de ambientes, desde las áreas costeras hasta las zonas altas, aunque es más frecuente en entornos humanizados.

## FENOLOGÍA



## IDENTIFICACIÓN

6 -9 mm.

Se caracteriza por las patas parcialmente rojizas. El tórax es grisáceo, con cuatro franjas longitudinales intermitentes de color negro; el ápice del escutelo es rojizo. El abdomen presenta un patrón teselado negro y gris amarillento. La base de las antenas es roja. Los machos se diferencian por tener los ojos muy próximos en la frente.



## PLANTAS VISITADAS

Visita flores sólo de forma ocasional. Tiene preferencia por *Euphorbia*, aunque también acude a *Argyranthemum*, *Foeniculum* o *Aeonium*.



## CICLO VITAL

Las larvas crecen en todo tipo de materia vegetal y animal en descomposición. Cuando están más desarrolladas actúan también como depredadoras de otras larvas.



*Muscina stabulans* (hembra), en *Aeonium urbicum*.  
Foto: Gustavo Peña.



*Muscina stabulans* (macho), en *Euphorbia lamarckii*.  
Foto: Gustavo Peña.