

Myathropa florea

Linnaeus, 1758




Mosca

NATIVA

DIPTERA
Syrphidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Norte de África, Europa y Asia. Introducida en Norteamérica.

En Canarias es más frecuente en las zonas bajas y de medianías de la vertiente septentrional de las islas, sobre todo en el entorno de áreas forestales o terrenos de cultivo. Evita las zonas más áridas del sur.



IDENTIFICACIÓN

10 - 14 mm.

De cuerpo bastante robusto, se caracteriza por la abundante pilosidad amarilla que lo recubre. En el dibujo del tórax sobresale una gran mancha oscura algo difuminada en su mitad posterior, que se asemeja a la silueta de un murciélago. El abdomen es ancho y negro con pares de manchas anaranjadas a los lados, siendo el primer par mucho mayor y con forma trapezoidal. Las patas son parcialmente rojizas. Ambos sexos son muy similares, diferenciándose los machos por el mayor tamaño de los ojos, que se unen en la frente.



PLANTAS VISITADAS

Tiene una especial inclinación por Apiaceae, como *Foeniculum*, *Ferula*, *Astydamia* o *Athamanta*, y por Asteraceae, como *Sonchus*, *Argyranthemum*, *Schizogyne* o *Glebionis*. También suele acudir a plantas de otras familias, como *Euphorbia*, *Aeonium*, *Cistus* o *Viburnum*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan normalmente en huecos de árboles y tocones en los que se acumula agua y materia orgánica en descomposición, donde se alimentan filtrando los microorganismos.



Myathropa florea (hembra), en *Cistus monspeliensis*.
Foto: Gustavo Peña.



Myathropa florea (macho), en *Athamanta montana*.
Foto: Gustavo Peña.