Vanessa atalanta Linnaeus, 1758

Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA
Nymphalidae

DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

Norte de África, Europa, oeste de Asia y Norteamérica. Migratoria.
En las islas occidentales ocupa principalmente zonas bajas y de medianías de la vertiente norte; en Lanzarote y Fuerteventura se observa sobre todo en valles y áreas montañosas del interior.

IDENTIFICACIÓN

64 - 78 mm. (envergadura alar).

El color de fondo de la cara dorsal de las alas es negro aterciopelado, que tiende a marrón en la base. Esta especie se caracteriza por la ancha banda rojo brillante que muestra en la parte central de las alas anteriores; hacia el ápice hay también algunas manchas blancas y pequeñas marcas azuladas. Las alas posteriores tienen en el borde exterior una banda roja con una serie de pequeños ocelos negros y azules. El dibujo de la cara inferior de las alas anteriores es similar al del dorso; el de las alas posteriores es, en cambio, muy abigarrado sobre fondo pardo grisáceo. Ambos sexos son prácticamente idénticos en coloración, siendo el macho de tamaño algo menor que la hembra.

PLANTAS VISITADAS

Aunque visita una amplia variedad de flores, exhibe una especial predilección por *Echium*. También acude con frecuencia a P*terocephalus, Pericallis, Limonium* o *Aeonium*. Además, es una visitante habitual de diversos árboles frutales, como *Eriobotrya*, *Citrus* o *Prunus*, donde no solo se alimenta de néctar, sino que también lo hace de los fluidos de la fruta fermentada.

CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan exclusivamente sobre plantas de la familia *Urticaceae*, como *Urtica* o *Parietaria*.

Vanessa atalanta (hembra). Foto: Pablo Martinez-Darve..

Vanessa atalanta (macho), en Pterocephalus lasiospermus.
Foto: Pablo Martinez-Darve.