

# Leptotes pirithous

Linnaeus, 1767




Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA  
Lycaenidae



## DISTRIBUCIÓN



## FENOLOGÍA



África, sur de Europa y oeste de Asia. Migratoria.

Se estableció en Canarias a partir de la década de 1990. Sus poblaciones se concentran en las partes bajas de las islas, especialmente alrededor de zonas urbanizadas.



## IDENTIFICACIÓN

22 - 28 mm. (envergadura alar).

La cara dorsal de las alas es de color azulado brillante en los machos, mientras que en las hembras es marrón oscuro, parcialmente teñido de azul. La cara ventral es de color marrón claro, con rayado blanco ondulado, pero sin bandas anchas. En la esquina inferior de las alas posteriores presenta "falsas antenas" y un par de ocelos con orla naranja, más destacados en el reverso.



## PLANTAS VISITADAS

Se han registrado visitas a plantas de diferentes familias, como *Plumbago*, *Hirschfeldia*, *Daphne*, *Echium*, *Argyranthemum*, *Sonchus* o *Bidens*.



## CICLO VITAL

Las larvas suelen desarrollarse sobre *Plumbago*, una planta ornamental que sólo se encuentra en jardines. También se alimentan de diversas plantas de la familia *Fabaceae*, como *Medicago*, *Lotus* o *Retama*.



*Leptotes pirithous* (hembra), en *Plumbago auriculata*.

Foto: Pablo Martínez-Darve.



*Leptotes pirithous* (macho), en *Plumbago auriculata*.

Foto: Pablo Martínez-Darve.