

Lycaena phlaeas

Linnaeus, 1761




Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA
Lycaenidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Norte de África, Europa y Asia.

En Canarias presenta una amplia distribución, desde las partes bajas hasta las cumbres, siendo una especie bastante frecuente.



IDENTIFICACIÓN

22 - 31 mm. (envergadura alar).

Las alas anteriores son de coloración anaranjado a rojizo, brillante, con manchas cuadradas negras bien marcadas, y con un ancho borde marrón. Las alas posteriores son de color marrón oscuro, con una banda rojiza junto al margen exterior. La cara ventral de las alas anteriores tiene el mismo diseño que por arriba, aunque con los colores más apagados; en las alas posteriores destaca la estrecha línea rojo herrumbre que zigzaguea junto al margen exterior. La intensidad de los colores es muy variable entre individuos.



PLANTAS VISITADAS

Visita una amplia variedad de plantas, con especial predilección por *Asteraceae*, como *Argyranthemum*, *Asteriscus*, *Glebionis* o *Calendula*, y *Lamiaceae*, como *Origanum*, *Micromeria* o *Sideritis*. Otras plantas a las que acude con frecuencia son *Pterocephalus*, *Hirschfeldia* o *Echium*.



CICLO VITAL

Las larvas se alimentan casi exclusivamente de plantas de la familia *Polygonaceae*, sobre todo *Rumex*.



Lycaena phlaeas (hembra), en *Schizogyne sericea*. Foto: Gustavo Peña.



Lycaena phlaeas (macho), en *Argyranthemum frutescens*.

Foto: Gustavo Peña.