Polyommatus celina Austaut, 1879

Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA
Lycaenidae

DISTRIBUCIÓN

FENOLOGÍA



Norte de África y sur de Europa.
En las islas presenta una distribución amplia, pudiéndose encontrar tanto en zonas costeras como del interior.

IDENTIFICACIÓN

28 - 36 mm. (envergadura alar).

Destaca la coloración azul brillante de las alas de los machos. En las hembras son predominantemente marrones, ligeramente teñidas de azul, y con series de lúnulas naranjas cerca del borde exterior de ambos pares de alas. La cara ventral, tanto en machos como en hembras, es de color marrón grisáceo, con numerosas manchas negras, orladas de blanco, y con bandas de lúnulas naranjas cerca del margen.

PLANTAS VISITADAS

AUn gran número de sus visitas se concentran en *Lotus* y *Heliotropium*. También acude habitualmente a *Asteraceae*, como *Launaea, Sonchus* o *Asteriscus*.

CICLO VITAL

LLas larvas se alimentan casi exclusivamente de *Lotus*, aunque pueden desarrollarse sobre otras plantas de la familia *Fabaceae*.

Polyommatus celina (hembra). Foto: Mónica Pérez.

Polyommatus celina (macho). Foto: Pablo Martinez-Darve.