

Zizeeria knysna

Trimen, 1862




Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA
Lycaenidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Norte de África y península Ibérica.

Tiene preferencia por las zonas costeras, a menudo en el entorno de lugares urbanizados.



IDENTIFICACIÓN

20 -25 mm. (envergadura alar).

La cara dorsal de las alas de los machos es de color azul violáceo, con el margen de todas las alas marrón y una estrecha franja blanca en los bordes. En las hembras son de color marrón muy oscuro, teñidas de azul en la base de las alas. La cara inferior de ambos pares de alas es marrón grisácea, con series de puntos negros, en la parte central, y de manchas marrones onduladas, en los márgenes.



PLANTAS VISITADAS

ASus visitas se concentran en *Asteraceae*, como *Launaea*, *Asteriscus*, *Glebionis*, *Schizogyne* o *Argyranthemum*. También suele observarse en flores de *Heliotropium* y *Mesembryanthemum*.



CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan en diferentes plantas herbáceas ruderales, como *Amaranthus*, *Medicago*, *Trifolium* o *Fagonia*. Son atendidas por hormigas del género *Pheidole*.



Zizeeria knysna (hembra), en *Glebionis coronaria*.

Foto: Francisco Molina.



Zizeeria knysna (macho). Foto: Pablo Martínez-Darve.