Danaus plexippus Linnaeus, 1758

Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA
Nymphalidae

DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA



Norteamérica. Se ha expandido por el Atlántico hacia la Macaronesia y el sur de Europa, y por el Pacífico hacia Oceanía. Migratoria.

Se estableció en Canarias durante el siglo XIX. Frecuenta las zonas bajas, especialmente en el entorno de lugares urbanizados, aunque dada su gran capacidad de vuelo puede ser observada en otros ambientes.

IDENTIFICACIÓN

90 - 105 mm. (envergadura alar).

Es la mariposa de mayor tamaño que vuela en Canarias. La coloración de fondo de las alas es naranja-marrón, con las venas fuertemente marcadas de negro, y el ápice de las alas anteriores también negro con manchas blancas. Todas las alas poseen también un ancho borde exterior negro, con dos series de puntos blanquecinos. Los machos se distinguen por tener las venas más estrechas y por dos manchas negras alargadas en las alas posteriores, que se corresponden con las escamas productoras de feromonas. En la cara ventral de las alas el dibujo es idéntico, pero con un tono más apagado.

PLANTAS VISITADAS

Acude con más frecuencia a diferentes especies exóticas, cultivadas en jardines, como *Bougainvillea*, *Lantana*, *Duranta* o *Asclepias*. Entre las plantas nativas, visita sobre todo *Echium, Bituminaria, Limonium, Lavandula* o *Euphorbia*.

CICLO VITAL

La principal planta nutricia de sus larvas es Asclepias, ampliamente cultivada en jardines de las islas, a menudo con el propio fin de atraer a esta mariposa. Ocasionalmente se observan en otras plantas de la familia *Apocynaceae*, como *Gomphocarpus* o *Calotropis*.

Danaus plexippus (hembra), en Echium sp. Foto: Pedro Javier Zerpa.

Danaus plexippus (macho), en Limonium arborescens. Foto: Gustavo Peña.