Vanessa vulcania Godart, 1819

Mariposa

ENDÉMICA MACARONESIA

LEPIDOPTERA
Nymphalidae

DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA



Endémica de Canarias y Madeira.
Es más frecuente en la vertiente norte de las islas, desde las zonas bajas hasta el borde superior de los pinares. En el sur se encuentra más localizada en áreas de medianías.

IDENTIFICACIÓN

50 - 62 mm. (envergadura alar).

Dorsalmente, las alas anteriores son de color negro, más marrón hacia la base. Es muy característica la banda roja con forma de letra "m" que atraviesa la zona central del ala. En el ápice y recorriendo el margen de ambos pares de alas, hay pequeñas manchas blancas. En el borde exterior de las alas posteriores también muestra sendas bandas rojas con pequeños ocelos negros y azules. El dibujo de las alas anteriores se reproduce igual en la cara ventral, aunque más marrón en el ápice; las alas posteriores, en cambio, presentan un patrón muy abigarrado. Ambos sexos son prácticamente idénticos en coloración, siendo el macho de tamaño algo menor que la hembra.

PLANTAS VISITADAS

Visita una amplia variedad de plantas, aunque manifiesta una gran preferencia por *Echium*. También acude asiduamente a *Pterocephalus, Sonchus, Pericallis, Cedronella, Rubus* o *Aeonium*.

CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan exclusivamente sobre plantas de la familia *Urticaceae*, como *Urtica* o *Parietaria*.

Vanessa vulcania (hembra), en Sonchus congestus.
Foto: Gustavo Peña.

Vanessa vulcania (macho), en Pterocephalus lasiospermus.
Foto: Gustavo Peña.