Cacyreus marshalli Butler, 1898

Mariposa

INTRODUCIDA

LEPIDOPTERA
Lycaenidae

DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA



Sur de África. Introducida en Europa.

Introducida en Canarias en la década de 1990, se ha expandido rápidamente por todo el archipiélago. Se distribuye sobre todo por las zonas bajas y de medianías, sobre todo en el entorno de áreas urbanizadas con jardines.

IDENTIFICACIÓN

15 - 27 mm. (envergadura alar).

La cara dorsal de ambos pares de alas presenta una coloración uniforme marrón oscura, que contrasta con el margen decorado a cuadros blancos. En el margen inferior de las alas posteriores muestra cuatro ocelos bordeados de blanco, de color marrón, salvo uno que es negro; destacan sendos apéndices o colas junto a los ocelos. La cara ventral de las alas presenta un un patrón abigarrado de rayas onduladas de color blanco, gris y marrón. Ambos sexos son muy similares, con las hembras más grandes y de coloración algo más apagada.

PLANTAS VISITADAS

Frecuenta plantas nativas de su región de origen, introducidas en Canarias como ornamentales, como *Pelargonium, Dimorphoteca* o *Carpobrotus*. Otras plantas a las que suele acudir incluyen a *Bidens, Euphorbia, Heliotropium* o *Aeonium*.

CICLO VITAL

Las larvas se alimentan de plantas de la familia *Genariaceae*, sobre todo *Pelargonium*, aunque también puede desarrollarse en *Geranium* o *Erodium*.

Cacyreus marshalli (hembra), en Argyranthemum frutescens. Foto: Amanhuy Duque.

Cacyreus marshalli (macho). Foto: Pablo Martinez-Darve.