

# *Leptotes webbianus* Brullé, 1839




Mariposa

ENDÉMICA

LEPIDOPTERA  
Lycaenidae



## DISTRIBUCIÓN



## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



### Endémica de Canarias.

Se distribuye ampliamente desde las zonas costeras hasta las cumbres, siendo especialmente frecuente en áreas de pinar.



## IDENTIFICACIÓN

28 - 34 mm. (envergadura alar).

La cara dorsal de las alas es de color marrón-rojizo con un tinte azul-violáceo, más extendido e intenso en los machos que en las hembras. El borde exterior en ambos sexos es marrón oscuro, festoneado de blanco. La cara ventral muestra en las alas anteriores una amplia zona de color anaranjado, y en las alas posteriores destaca una diagnóstica banda blanca zigzagueante. Se han descrito tres subespecies -*webbianus* (Tenerife, La Gomera y El Hierro), *palmae* (La Palma) y *grancanariensis* (Gran Canaria)-, que se diferencian, entre otras características, por el ancho de la banda blanca de las alas posteriores.



## PLANTAS VISITADAS

Acude a una gran diversidad de plantas, aunque manifiesta preferencia por *Fabaceae*, como *Bituminaria*, *Lotus* o *Adenocarpus*; *Lamiaceae*, como *Sideritis*, *Micromeria*, *Bystropogon* o *Lavandula*; y *Asteraceae*, como *Carlina*, *Cheirolophus* o *Pericallis*. También visita habitualmente plantas de otras familias, como *Pterocephalus*, *Daphne*, *Cistus* o *Descurainia*.



## CICLO VITAL

Las larvas se alimentan de plantas de la familia *Fabaceae*, como *Lotus*, *Adenocarpus*, *Teline* o *Chamaecytisus*.



*Leptotes webbianus* (hembra), en *Sideritis soluta*. Foto: Gustavo Peña..



*Leptotes webbianus* (macho). Foto: Gustavo Peña.