Panurgus canarius Warncke, 1972

Abeja

ENDÉMICA MACARONESIA

HYMENOPTERA
Andrenidae

DISTRIBUCIÓN

FENOLOGÍA

Endémica de Canarias y Marruecos.
En Canarias, se distribuye ampliamente, tanto por las zonas bajas costeras como por valles y áreas montañosas del interior, aunque no llega a ser una especie frecuente.

IDENTIFICACIÓN

6 - 8 mm.
Se caracteriza por su coloración completamente negra, muy brillante, con la cabeza bastante ancha, sobre todo en los machos, y las mandíbulas destacadamente largas. El cuerpo se encuentra apenas recubierto de pelos de color marrón oscuro. La hembra posee grandes escopas en las patas traseras, formadas por pelos amarillentos muy largos, que le permiten transportar un gran volumen de polen. Es diagnóstica la forma que tiene de recoger el polen, tumbada de lado mientras se arrastra alrededor de los capítulos.

PLANTAS VISITADAS

Se encuentra muy especializada en Asteraceae, concentrando la gran mayoría de sus visitas en *Reichardia, Launaea, Glebionis, Andryala* o *Sonchus.*

CICLO VITAL

Las especies del género *Panurgus* construyen nidos en el suelo, donde excavan túneles ramificados lateralmente. Al final de las ramas construyen las celdas y en cada una de ellas se desarrolla una larva, alimentándose de la mezcla de polen y néctar recolectada por la hembra. A diferencia de *Andrena*, no acumula la tierra alrededor de la entrada del nido.

Panurgus canarius (hembra), en *Launaea arborescens.*
Foto: Amanhuy Duque.

Panurgus canarius (macho), en *Launaea arborescens.*
Foto: Gustavo Peña.