

Phthiria simonyi

Becker, 1908




ENDÉMICA

DIPTERA
Bombyliidae



DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Es más frecuente en medianías y zonas altas, aunque ocasionalmente se observa en las áreas costeras.

FENOLOGÍA



IDENTIFICACIÓN

3 - 5 mm.

Destaca por su larga trompa curvada hacia abajo, casi tan larga como el cuerpo. El tórax es muy convexo, de color gris con cuatro franjas longitudinales más oscuras; las hembras tienen varias manchas blancas en los laterales, ausentes en los machos. Las patas son en gran parte de color rojizo o amarillento. El abdomen es de forma cónica y de color negro con bandeo amarillento. Los machos se diferencian por tener algo sombreadas las venas transversales de las alas y los ojos unidos en la frente.



PLANTAS VISITADAS

Tiene preferencia por *Asteraceae*, como *Carlina*, *Argyranthemum*, *Sonchus*, *Pericallis* o *Cheirolophus*. También visita con cierta asiduidad plantas de otras familias, como *Aeonium*, *Pterocephalus*, *Plocama* o *Cistus*.



CICLO VITAL

Las larvas de las especies del género *Phthiria* se desarrollan sobre las orugas de ciertas mariposas nocturnas.



Phthiria simonyi (hembra), en *Cistus monspeliensis*.

Foto: Gustavo Peña.



Phthiria simonyi (macho), en *Pterocephalus lasiospermus*.

Foto: Gustavo Peña.