Physiphora alceae Preyssler, 1791

Mosca

INTRODUCIDA

DIPTERA
Ulidiidae

DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA



Casi cosmopolita.
Introducida en Canarias. Se localiza fundamentalmente en las zonas costeras, cerca de áreas antropizadas, aunque no es una especie común.

IDENTIFICACIÓN

5 - 6 mm. El diseño de bandas horizontales púrpuras en los ojos es una de sus características más llamativas. El resto de la cabeza es de color marrón-naranja. El tórax presenta un brillo metálico verde o dorado, mientras que el abdomen es marrón oscuro con reflejos verdosos o azulados. Las patas son oscuras, a excepción de los basitarsos, que son en su mayor parte amarillentos. Las alas son transparentes, con la venación rojiza. Las hembras se diferencian por la presencia de un ovopositor corto y ancho en el extremo del abdomen.
.

PLANTAS VISITADAS

Es un visitante asiduo de *Euphorbia*, aunque también ha sido observada en otras plantas, como *Periploca*, *Astydamia* o *Polycarpaea*.

CICLO VITAL

Las larvas se desarrollan, por lo general, en estiércol o compost. También pueden crecer en tallos de palmeras en descomposición e, incluso, en cadáveres de animales.

Physiphora alceae (hembra), en *Polycarpaea nivea*.
Foto: Gustavo Peña.

Physiphora alceae (macho), en *Euphorbia lamarckii*.
Foto: Gustavo Peña.