

# Pieris cheiranthi

Hübner, 1808



Mariposa


ENDÉMICA

LEPIDOPTERA

Pieridae



## DISTRIBUCIÓN



Endémica de Canarias.

Ocupa principalmente las zonas bajas y de medianías de la vertiente norte, siendo bastante más frecuente en La Palma que en Tenerife.

## FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia media

Abundancia máxima



## IDENTIFICACIÓN

55 - 70 mm. (envergadura alar).

Las alas tienen un color de fondo blanco, con el ápice de las anteriores de color oscuro, algo más extendido en hembras que en machos. Además, las hembras presentan en la parte central de las alas anteriores sendas bandas oscuras de borde irregular, mientras que los machos muestran, a lo sumo, un pequeño punto. La cara dorsal de las alas posteriores de las hembras es amarillenta (blanca en los machos). En la cara ventral, tanto machos como hembras muestran una banda negra en el centro de las alas anteriores; además, el ápice de las alas anteriores y toda la superficie de las alas posteriores son amarillas.



## PLANTAS VISITADAS

Entre las plantas más visitadas se encuentran *Bituminaria*, *Echium* o *Asteraceae*, como *Galactites*, *Bidens*, *Sonchus*, *Carduus* o *Kleinia*. También es atraída por *Lamiaceae*, como *Lavandula*, *Micromeria* o *Cedronella*, así como por plantas de jardín, sobre todo *Lantana*.



## CICLO VITAL

Las larvas se alimentan principalmente de plantas de la familia *Brassicaceae*, como *Crambe*, *Brassica*, *Descurainia*, *Sisymbrium* o *Erucastrum*. Alternativamente, también puede desarrollarse sobre *Tropaeolum*.



*Pieris cheiranthi* (hembra). Foto: Pablo Martínez-Darve.



*Pieris cheiranthi* (macho), en *Lavandula canariensis*.

Foto: Pablo Martínez-Darve.