

Pollenia rudis

Fabricius, 1794



Mosca

NATIVA

DIPTERA
Polleniidae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D



Europa y Asia. Introducida en Norteamérica y Nueva Zelanda.

En Canarias es una especie poco abundante, que ocupa preferentemente las zonas bajas y de medianías de la vertiente norte de las islas; más esporádica por las medianías del sur.



IDENTIFICACIÓN

8 -12 mm.

La característica más destacada es la pilosidad amarillenta que recubre el tórax, más abundante en las hembras, casi ausente en los machos. La coloración del cuerpo es bastante oscura, presentando el abdomen un patrón teselado grisáceo y negro. La base de las antenas es rojiza.



PLANTAS VISITADAS

Es más frecuente observarla posada sobre grandes hojas, pero ocasionalmente visita las flores, con preferencia por Asteraceae, como *Argyranthemum* o *Pericallis*. También acude a plantas de otras familias, como *Euphorbia*, *Foeniculum* o *Ranunculus*.



CICLO VITAL

Las hembras depositan los huevos en la superficie de suelos húmedos. Las larvas penetran en el suelo y parasitan lombrices de tierra, desarrollándose en el interior del cuerpo del hospedador.



Pollenia rudis (hembra), en *Athamanta montana*.
Foto: Gustavo Peña.



Pollenia rudis (macho), en *Argyranthemum frutescens*.
Foto: Gustavo Peña.