

Pontia daplidice

Linnaeus, 1758




Mariposa

NATIVA

LEPIDOPTERA
Pieridae



DISTRIBUCIÓN



FENOLOGÍA

E F M A M J J A S O N D

Ausencia

Abundancia
media

Abundancia
máxima

Norte de África, Europa y Asia.

Se encuentra ampliamente distribuida en Canarias, desde las zonas bajas hasta las cumbres, siendo una especie relativamente frecuente.



IDENTIFICACIÓN

38 - 48 mm. (envergadura alar).

En visión dorsal, las alas son blancas, con un característico patrón de marcas circulares negras interconectadas entre sí en el margen exterior de ambos pares de alas, aunque en los machos las alas posteriores carecen de esas manchas. Adicionalmente, hay dos manchas negras en la zona media de las alas anteriores, la inferior más reducida en tamaño, o directamente ausente, en los machos. En la cara ventral se repite el dibujo, pero con una coloración verde amarillenta; en las alas posteriores, el patrón de manchas se extiende por toda la superficie.



PLANTAS VISITADAS

Es especialmente atraída por *Asteraceae*, como *Launaea*, *Schizogyne*, *Centaurea*, *Bidens*, *Argyranthemum*, *Volutaria* o *Phagnalon*. También visita asiduamente *Brassicaceae*, como *Hirschfeldia*, *Erysimum* o *Descurainia*, y *Lamiaceae*, como *Lavandula*, *Micromeria* o *Marrubium*. Otras plantas a las que suele acudir son *Pterocephalus*, *Heliotropium*, *Mesembryanthemum* o *Bituminaria*.



CICLO VITAL

Las larvas se alimentan fundamentalmente de plantas del género *Reseda*, aunque también pueden desarrollarse sobre plantas de la familia *Brassicaceae*, como *Hirschfeldia*, *Erysimum* o *Descurainia*.



Pontia daplidice (hembra), en *Pterocephalus lasiospermus*.

Foto: Gustavo Peña.



Pontia daplidice (hembra), en *Pterocephalus lasiospermus*.

Foto: Gustavo Peña.